


Prurito y Parasitosis

Niño con intenso prurito anal, irritable. La madre refiere que en la ropa interior de otro hijo observó un elemento de aprox. 1 cm de largo, blanquecino y una hija presenta prurito vulvar.


Buen estado general, con lesiones por rascado en región perianal.

Sintomatología familiar y el elemento observado se piensa en


Oxiuriasis -*Enterobius Vermicularis*.



Oxiuros











Oxiuriasis

Dx: Escobillado anal y parasitológico seriado de M.F. (descartar otras parasitosis asociadas).

TTO: Tratamiento familiar y repetir a los 7-10 días.

- ▶ Mebendazol 100 mg (1 toma).
- ▶ Pamoato de Pirviño o de Pirantel (1 toma).
- ▶ En mayores de 2 años: Albendazol 200 mg (1 toma).

Profilaxis: Explicar sobre la importancia de tratamiento completo y familiar y sobre la forma de transmisión del parásito.



Parasitosis Urogenital

Mujer en edad fértil que consulta por disuria y/o dispareunia y/o flujo maloliente y/o prurito vulvar y/o disminución de apetito sexual..

Al examen: lesiones de rascado y edema en genitales externos. Especuloscopia: vagina congestiva, con estigmas de sangrado, secreción maloliente verde amarillenta.


Descartar etiologías bacterianas y micóticas...

Pensar en I.T.S. de origen parasitario:

- ▶ *Trichomonas vaginalis*

Trichomonas Vaginalis

Trichomonas vaginalis




(by P.W. Pappas and S.M. Wardrop)

Trichomonas vaginalis




trophozoite

(by P.W. Pappas and S.M. Wardrop)



Diagnóstico

Métodos Directos: estudio de secreción vaginal





VID-20130728-WA0001.mp4