

# Ascariosis

**DX: Macroscopía.** Parasitológico seriado de M.F (huevos). **No coprocultivo.**

**TTO:** Repetir a 7-10 días.

- ▶ **Mebendazol o Flubendazol 200 mg/día (3 días).**
- ▶ **Albendazol 400 mg/día (3 días).**

**Profilaxis:** Adecuada eliminación de excretas, higiene, control de acarreadores mecánicos).

# Parásitos Macroscópicos



Paciente de 40 años, refiere desde hace un tiempo dispepsia tipo ulcerosa y dolor epigástrico esporádico; distensión abdominal, en ocasiones diarrea. Manifiesta estar muy estresado.

Ecografía abdominal sin particularidades.

Recientemente, salida por región anal de gusano chato, de cuerpo segmentado...






**Tenia**



# Ciclo de Vida de Tenias

**Saginata y Solium**

Larvas en  
carnes  
vacunas o  
porcinas



Huevos en  
el Medio



Adultos  
en el  
Hombre



# Tenia Saginata




Taenia saginata

Gravid Proglottid




# Tenia Solium





Taenia solium



Scolex



Gravid Proglottid



















# Teniosis

**DX:** Examen de las proglótides eliminadas (morfología) para diferenciar la especie.

Parasitológico seriado de M.F (huevos), para control

**Solamente asegura curación la eliminación del éscolex; sino controlar con Parasitológico seriado de M.F a los 3 meses.**

**TTO:** Praziquantel 5-7 mg/kg (1 toma en ayunas). Luego laxante suave para la eliminación.





**Profilaxis: Educar sobre forma de contagio, **coCCIÓN de carnes.****

**Correcta eliminación de excretas.**

**Control bromatológico.**

**Estudiar Cisticercosis...**