

Terapéutica Adecuada

OFIDIOS

Actitud ante un caso de emponzoñamiento



Mantenga la calma



Limpie el área de la mordedura



Utilice un elemento adecuado para manejar al ofidio



NO ponga ninguna sustancia en la herida




NO haga cortes en la herida



**NO extraiga el veneno con la boca
u otros elementos**

El viejo concepto de realizar un torniquete alrededor del miembro lesionado para evitar la dispersión del veneno....

Son estas lesiones, auto infligidas, la mayor complicación de mordedura por víboras venenosas.




**NO HAGA
TORNIQUETES**

Diagnósticos Diferenciales!!!




Torniquete !!!





**ACOMODE Y TRANSPORTE
CORRECTAMENTE
AL ACCIDENTADO**



**Procure atención
médica**

Consejos “Tips” de Terapéutica

- Los “sueros” ... son Antivenenos!
- Polivalentes...NO ES PARA TODAS LAS ESPECIES!
- NO se colocan en sitio de mordedura!
- Dosis independiente de edad, sexo, embarazo!
- No por temor al “suero”, poner dosis bajas y lentamente!
- Los corticoides no son la salvación!
- Dosis adecuada (neutralice 75 a 100 mg.)

TRATAMIENTO anti- BHOTROPS (YARARÁ)

Antiveneno: ampollas de 10 ml

1 frasco ampolla neutraliza 25 mg. de veneno

- Casos LEVES : 3 a 4 ampollas
- Casos MODERADOS: 5 a 8 ampollas
- Casos GRAVES: 9 a 12 ampollas, o mas

Letalidad baja: → 8 al 10% sin tratamiento

→ 0,5 al 0,7% con tratamiento

TRATAMIENTO anti- CROTALUS (CASCABEL)

Antiveneno: ampollas de 10 ml

1 frasco ampolla neutraliza 14 mg. de veneno

- Casos LEVES : desde 5 ampollas
- Casos MODERADOS: hasta 10 ampollas
- Casos GRAVES: 10 a 20 ampollas
- Letalidad ALTA → 65 al 75% sin tratamiento
→ 12% con tratamiento

TRATAMIENTO anti- MICRURUS (CORAL)

Antiveneno: ampollas de 10 ml

1 frasco ampolla neutraliza 10 mg. de veneno

Todos los cuadros son considerados graves

- CASOS GRAVES: 10 ampollas o más
- Tratamiento Sostén: ventilación Mecánica, neostigmine (Prostigmin) acción anticolinesterásica y atropina por efectos muscarínicos (bradicardia e hipersecreción)

Presentación de los Antivenenos



Dirección General Programa Integrado de Salud
Departamento de Enfermedades Transmisibles
División Zoonosis

TÓXICOS ANIMALES

Fecha.....H. Clínica Nro.....Hora de Consulta.....
 Nombre y Apellido:.....
 Edad.....Sexo.....Ocupación.....
 Domicilio. Calle.y Nro.....
 Ciudad.....Provincia.....
 Centro Asistencial donde ingresa.....
 Centro Asistencial donde fue derivado.....

SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE BIOL

SUERO ANTIOFIDICO PARA
MORDEDURA DE YARARA,
DE LA CRUZ Y CASCABEL

Liofilizado Inyectable

CONTENIDO: Caja conteniendo frasco ampolla liofilizado -
ampolla diluyente de 10 ml - jeringa y agua estéril
para aplicación intramuscular - sobre con alcohol.

Industria Argentina

Venta bajo receta



INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C.



SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE BIOL

SUERO ANTIOFIDICO PARA MORDEDURA
DE YARARA, DE LA CRUZ Y CASCABEL

Liofilizado Inyectable

CONTENIDO: Caja conteniendo frasco ampolla liofilizado - ampolla diluyente de 10 ml - jeringa y aguja estéril para aplicación intramuscular - sobre con alcohol.

Industria Argentina

Venta bajo receta



10 ml

AGUA
ESTILADA



INDUSTRIA ARGENTINA
SERO ANTIOFIDICO POLI
SERO ANTIOFIDICO PARA MORDEDURA DE YARACU
LIOFILIZADO INYECTAB


Cada vial contiene inmunoglobulinas equinas purificadas capaces de neutralizar
1 mg Veneno de Bothrops alternatus 12,5 mg. Veneno de Bothrops neuwiedi
1 mg y 25 mg. Timerosal 0,5 mg. Diluyente: Cada ampolla contiene 10 ml de suero
(CONGELAR) y utilizar dentro de las 24 horas siguientes a la reconstitución
por M.S. - Certificado N° 37.217 - Liofilizado en Bogotá 3925 C140758

INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO
Dir. Tec.: Dra. Anabela M. Martínez
Dirección y Adm.: José Evaristo Uniburu 153 - C140758
Laboratorios: Calle 606 Dr. Dessy 351 - 81867016

Pautas de Prevención

OFIDIOS

Medidas preventivas básicas



- Botas caña alta o Polainas
- Guantes de cuero